



DATOS IMPORTANTES
Este es solamente un breve resumen de la información importante sobre TUKYSA. Hable con su proveedor de atención médica o farmacéutico para más información.

ACERCA DE TUKYSA

TUKYSA es un medicamento de venta con receta médica que se emplea con los medicamentos trastuzumab y capecitabina para tratar a adultos con cáncer de mama positivo para el receptor-2 del factor de crecimiento epidérmico humano (HER2) que se ha propagado a otras partes del cuerpo, tal como el cerebro (metastásico), o que no se puede extirpar mediante cirugía, y quienes han recibido uno o más tratamientos con anti-HER2 para el cáncer de mama.

Se desconoce si TUKYSA es seguro y eficaz en niños.

Información importante: Lea también la Guía del medicamento capecitabina.

ANTES DE TOMAR TUKYSA

Informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas, incluido si usted:

- Tiene problemas hepáticos
- Está embarazada o planea quedar embarazada. TUKYSA puede dañar al feto

Mujeres que pueden quedar embarazadas:

- Su proveedor de atención médica le hará una prueba de embarazo antes de iniciar el tratamiento con TUKYSA
- Deben usar un método anticonceptivo (anticoncepción) durante el tratamiento con TUKYSA y durante al menos 1 semana después de la última dosis de TUKYSA. Hable con su proveedor de atención médica sobre los métodos anticonceptivos que puede usar durante este período
- Informe de inmediato a su proveedor de atención médica si queda embarazada o piensa que podría estar embarazada durante el tratamiento con TUKYSA

Hombres con parejas femeninas que puedan quedar embarazadas:

- Deben usar un método anticonceptivo (anticoncepción) durante el tratamiento con TUKYSA y durante al menos 1 semana después de la última dosis de TUKYSA
- Está amamantando o planea amamantar. No amamante durante el tratamiento con TUKYSA y durante al menos 1 semana después de la última dosis de TUKYSA

Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que toma, incluidos los medicamentos de venta con receta médica y de venta libre, vitaminas y suplementos a base de hierbas.

- TUKYSA puede afectar al mecanismo de acción de los otros medicamentos que toma y otros medicamentos podrían afectar al mecanismo de acción de TUKYSA
- Mantenga una lista de todos los medicamentos que toma y muéstresela a su proveedor de atención médica y a su farmacéutico cada vez que obtenga un nuevo medicamento

CÓMO TOMAR TUKYSA

- Tome TUKYSA 2 veces al día con o sin alimentos
- Tome TUKYSA con un intervalo aproximado de 12 horas o a la misma hora todos los días
- Trague los comprimidos de TUKYSA enteros. No mastique, triture ni parta los comprimidos. No tome los comprimidos de TUKYSA si están rotos, agrietados o dañados
- Si vomita o se salta una dosis de TUKYSA, tome la siguiente dosis a la hora habitual

POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS DE TUKYSA

TUKYSA puede causar efectos secundarios graves, incluidos:

- **Diarrea** (deposiciones acuosas, blandas o frecuentes), lo que es común y puede a veces ser grave
 - La diarrea intensa puede provocar la pérdida excesiva de líquido corporal (deshidratación), presión arterial baja, problemas renales y la muerte
 - Informe a su proveedor de atención médica si ha presentado un cambio en sus deposiciones o tiene diarrea intensa. Su proveedor de atención médica puede recetarle medicamentos para tratarle la diarrea durante el tratamiento con TUKYSA
- **Problemas hepáticos**, incluidos casos graves. Su proveedor de atención médica le analizará la sangre para revisar la función hepática antes de iniciar TUKYSA y cada 3 semanas durante el tratamiento con TUKYSA, o según sea necesario.

Informe de inmediato a su proveedor de atención médica si presenta signos o síntomas de problemas hepáticos, incluidos comezón, amarilleamiento de la piel o los ojos, orina oscura o marrón (color del té), dolor en el lado superior derecho del estómago (abdomen), sensación de mucho cansancio, disminución del apetito o sangrado o formación de moretones más fácilmente de lo normal.

Los efectos secundarios más frecuentes de TUKYSA incluyen:

- diarrea
- erupción cutánea, enrojecimiento, dolor, hinchazón o formación de ampollas en las palmas de las manos o en la planta de los pies
- náuseas
- cansancio
- aumento de las pruebas sanguíneas de la función hepática
- vómitos
- úlceras en la boca (estomatitis)
- disminución del apetito
- dolor en la zona del estómago (abdomen)
- dolor de cabeza
- recuentos bajos de glóbulos rojos (anemia)
- erupción cutánea

Su proveedor de atención médica puede cambiarle la dosis de TUKYSA, suspenderla de manera temporal o interrumpir permanentemente el tratamiento con TUKYSA si presenta determinados efectos secundarios.

TUKYSA puede causar problemas de fertilidad en hombres y mujeres, lo que podría afectar a la capacidad de tener hijos. Hable con su proveedor de atención médica si tiene inquietudes sobre la fertilidad. Estos no son todos los posibles efectos secundarios de TUKYSA. Llame a su médico para recibir asesoramiento médico sobre los efectos secundarios.

OBTENGA MÁS INFORMACIÓN

- Este es solamente un breve resumen de la información importante sobre TUKYSA. Hable con su proveedor de atención médica o farmacéutico para informarse más
- Visite www.TUKYSA.com o llame al **1-855-4SEAGEN**
- Si necesita ayuda para pagar su medicamento, visite www.SeaGenSecure.com para más información sobre el programa



TUKYSA y su logotipo son marcas comerciales de Seattle Genetics, Inc. SeaGen Secure y su logotipo, y Seattle Genetics y  son marcas comerciales de Seattle Genetics, Inc. registradas en EE. UU.
© 2020 Seattle Genetics, Inc., Bothell, WA 98021

Todos los derechos reservados. US-TUP-20-330-TM